



ফসল	পোকামাকড় নাম	ফসলের যে অংশে পোকামাকড় চেনার উপায় আক্রমণ করে	প্রধান ক্ষতির লক্ষণ	
আলু	সুতলী পোকা	আগা , কাণ্ড , ডগা পোকাকার মথ আকারে ছোট, রূপালি, ধূসর, ছোট ছোট সরু পশমের মতো , ফল	* কীড়া ডিম থেকে ফুটেই ১২-১৫ দিন আলুর পাতার সবুজ অংশ খেতে খেতে সুরঙ্গ করে কাণ্ডে ঢুকে। কাণ্ডে ঢুকলে কাণ্ডের আগা মরে যায় এবং পরে তা ভেঙেগ পড়ে। * মথ আলুর চোখের কাছে ডিম পাড়লে কীড়া ডিম থেকে ফুটেই ১২-১৫ দিন ধরে আলুর খেতে খেতে আলুর ভিতরে ঢুকে আলুর খোসার নিচে সুরঙ্গ তৈরি করে। এতে আলুর বাকি পচে যায় তাতে কীড়ার মলে ভরা থাকে। * সংরক্ষিত আলুতে ও ক্ষতি কর।	
আলু	জাব পোকা	কাণ্ড , পাতা , ডগা পূর্ণ বয়সী পোকা ছোট, প্রায় মাথার উকুনের সমান। সবুজ/কাদামি রঙের।	পোকা পাতা, কাণ্ড ও ডগা থেকে রস চুষে খায়। আলুর পাতা মোড়ানো ভাইরাস এবং অন্যান্য ভাইরাস ছড়ায়। আক্রান্ত পাতা কঁকড়ে যায় এবং হলুদ বা নানা রঙ ও অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে।	
আলু	কাটুই পোকা	কাণ্ড , ডগা , সব , *পূর্ণ বয়সী পোকা মাঝারি আকারের ধূসর রঙের, তার মধ্যে কালছে ছোপ। পূর্ণদিনের বেলায় মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে, রাতে চারার গোড়া কেটে দেয়। শিকড়	আলু ছত্রি করে।	
পেঁয়াজ	পেঁয়াজের ঘোড়া পোকা	আগা , পাতা , অল্পবয়সী পোকা এক ধরনের মথ। ডিম ফুটে সবুজ রঙের ২-২.৫ সেমি ডগা , কচি পাতা , কীড়া ফলের ভিতরে বাস করে। সব	পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ক্ষতি করে।	
লাউ	রেড পামকিন বিটল	পাতা , কচি পাতা এ পোকা দেখতে ক্ষুদ্র লাল রঙের , ফল , ফুল	পোকা ঝাঝড়া করে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে চারা গাছেভ আগা, ফুল ও কচি ফল আক্রান্ত হয়।	
লাউ	ফলের মাছি পোকা	ফল	প্রাপ্ত বয়স্ক ও বড় আকারের কীড়ার গায়ের রঙ কিছুটা কালো ধরনের এবং স্ত্রী মাছিগর্ভাশয় বা ফলের সাধারণত নিচের দিকে চামড়া/খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ডিম পাড়ায় এ জাগায় (ক) পানির মতো কষ বেড় হয়, পরে শুকিয়ে বা বাদামি আঠা হয়ে জমে থাকে। (খ) এখান থেকে জীবাণু দিয়ে পচন শুরু হলে ধূসর / কালো দাগ ছড়িয়ে পড়ে। (গ) কীড়ার কালো মল দেখা যেতে পারে। (ঘ) ধীরে ধীরে ফল পচতে থাকে। (ঙ) কচি ফল লাল হয়ে ধরে পড়ে। বাড়ন্ত ফল বিকৃতি আকার ধারণ করে।	
তরমুজ	জাব পোকা	কাণ্ড , পাতা , ডগা পোকা দেখতে খুবই ক্ষুদ্র। এদের পাখা বা পাখাখীন উভয় অবস্থায় দেখা , কচি পাতা , ফল যায়। , ফুল	গাছের কচি কাণ্ড, ডগা ও পাতার রস খেয়ে ক্ষতি করে।	
টমেটো	জাব পোকা	কাণ্ড , পাতা , ডগা পোকা দেখতে ক্ষুদ্র সবুজ, খুবই নরম দেহের পোকা। , কচি পাতা	পাতা ও কচি ডগা থেকে রস চুষে খায়	
চীনাবাদাম উইপোকা	বীজ	পোকা সাদা, শরীর নরম, মাথা লাল এবং কাঁচির মত দুটি দাত আছে।	এরা দলবদ্ধ হয়ে গাছের প্রধান শিকড় কেটে দেয় ও শিকড়ের ভিতরে গর্ত সৃষ্টি করে। মাটির নিচে বাদামের খোসা ছিদ্র করে বীজ খায়।	
পাট	কালো বিছা পোকা (Black Hairy Caterpillar)	পাতা	পূর্ণ বয়স্ক মথের রঙ কালো পাখা ধূসর বাদামী রঙের পাখার উপর কালো ফোটা আছে। পিছনের পাখা জোড়া কমলা রঙের। মথের পাখার উপরের শিরা ও কিনারা বরাবর অনেকগুলো ছোট ছোট কালো ফোটা আছে এবং ফোটাগুলো একত্রে মিশে মোটা কালো দাগের সৃষ্টি করে। এ মথের কীড়া প্রাথমিক অবস্থায় রং সবুজ, ক্রমেই বাদামী ও পরে কালো রঙের হয়। এদের শরীর ঘন গুঁজ দ্বারা আবৃত থাকে। পুনঃ কীড়া লম্বায় ৪সেমিঃ।	জুন মাসের প্রথম হতে জুলাই মাস পর্যন্ত আক্রমণের সময়। প্রাথমিক অবস্থায় কীড়া পাতার সবুজ অংশ খায় এবং ক্রমেই বড় হতে থাকে পরে পাতা খায় ও গাছের বৃদ্ধি প্রতিহত করে। এ পোকা গাছের সৌণ পোকা হিসেবে চিহ্নিত।
মরিচ	ক্ষুদে মাকড় (মাইট)	আগা , কাণ্ড , পাতা , কাণ্ডের গোঁড়ায়	এ পোকা দেখতে অত্যন্ত ছোট, সাধারণত হাত লেপের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। পোকা উপবৃত্তাকার, উজ্জ্বল, হলদে সবুজ বর্ণের অট পা বিশিষ্ট।	মাইট গাছের রস শোষণ করে এবং পানি স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। পাতা ফাঁকাসে, মোচড়ানো এবং নিচের দিকে নৌকার মত বাঁকানো হয়। পাতা চামড়ার মত হয়ে যায় এবং শিরাগুলো মোটা হয়। পাতা এবং কচি কাণ্ড লালচে বর্ণের হয়। ফুলের কুঁড়ি বাঁকানো এবং মোচড়ানো হয়। পাতার নিচের পৃষ্ঠে জাল দেখা যায়।
মরিচ	খ্রিপস	পাতা	উকুনের মত ছোট চিকন কালো ও লম্বাটে। বাচ্চা সাদা।	পাতা সাদা হয়ে কঁকড়ে যায়।
মরিচ	জাব পোকা	পাতা , ডগা , কচি পোকা দেখতে ক্ষুদ্র সবুজ, খুবই নরম দেহের পোকা পাতা	পাতা ও ডগার রস চুষে খেয়ে পাতাকে বিবর্ণ করে ও পাতা, ফুল কঁকড়ে যায়।	
চীনাবাদাম পিপড়া	ফল , শিকড়	এরা খুবই ছোট কালো ও লাল উভয় রঙের হয়ে থাকে।	জমিতে বাদাম লাগানোর পর পরেই পিপড়া আক্রমণ করে রোপিত বাদামের দানা সব খেয়ে ফেলে।	